



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
(МОЗ України)

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: <http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

13. 11. 2017 № 05.2-10/17/1405/ЗПІ-17/29920 На № _____ від _____

гр. Тетяна

<mailto:foi+request-27544->

clj57d732@dostup.prawda.cQm.ua

Міністерство охорони здоров'я України розглянуло Ваш запит на публічну інформацію щодо застосування туберкулінових проб та повідомляє.

Статтею 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначено перелік інфекцій, у т. ч. туберкульоз, щеплення проти яких є обов'язковими та які внесено до Календаря профілактичних щеплень, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.09.2011 № 595 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», (у редакції наказу МОЗ України від 11.08.2014 № 551), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 10.10.2011 р. за № 1159/19897 (далі – Календар щеплень).

Відповідно до Порядку проведення щеплень, визначеного Календарем щеплень, якщо дитина не щеплена проти туберкульозу в пологовому стаціонарі через медичні протипоказання, щеплення проводиться вакциною БЦЖ-м, в інших випадках щеплення проводиться вакциною для профілактики туберкульозу (далі – БЦЖ). Дітям, яким не виповнилося два місяці, щеплення проти туберкульозу проводиться без попередньої проби Манту. Після двомісячного віку перед виконанням щеплення БЦЖ дитині слід провести пробу Манту. Щеплення проводиться при негативному результаті проби. З метою раннього виявлення туберкульозу проба Манту з 2-а туберкуліновими одиницями туберкуліну застосовується для всіх дітей з 12-місячного віку систематично раз на рік незалежно від попереднього результату. Ревакцинації проти туберкульозу підлягають діти у віці 7 років з негативним результатом проби Манту. Ревакцинація проводиться вакциною БЦЖ.

У зв'язку з тим, що профілактичні щеплення можуть вплинути на чутливість до туберкуліну, при проведенні туберкулінодіагностики за віком її необхідно планувати до проведення профілактичних щеплень. У разі якщо з тих або інших причин пробу Манту проводять після проведення профілактичних щеплень, туберкулінодіагностика повинна здійснюватись не раніше ніж через один місяць після щеплення.

Основні аспекти застосування туберкулінових проб врегульовано наказом МОЗ України від 29.07.96 № 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 вересня 1996 р. за № 538/1563.

Разом з тим повідомляємо, що статтею 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» визначено, що прийом дітей до виховних,